

Felimare cantabrica (Bouchet & Ortea, 1981)

AphiaID: 597543

NUDIBRÂNQUIO

Biota (Superdomínio) > Animalia (Reino) > Mollusca (Filo) > Gastropoda (Classe) > Heterobranchia (Subclasse) > Euthyneura (Infraclasse) > Ringipleura (Subterclasse) > Nudipleura (Superordem) > Nudibranchia (Ordem) > Doridina (Subordem) > Doridoidei (Infraordem) > Chromodoridoidea (Superfamília) > Chromodorididae (Família) > Miamirinae (Subfamília) > Felimare (Gênero)



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados

Facilmente confundível com:



Felimare fontandraui
Nudibrânquio



Felimare tricolor
Nudibrânquio



Felimare bilineata
Nudibrânquio



Felimare villafranca
Nudibrânquio

Principais ameaças



Sinónimos

Hypselodoris cantabrica Bouchet & Ortea, 1980

Referências

Johnson R.F. & Gosliner T.M. (2012) Traditional taxonomic groupings mask evolutionary history: A molecular phylogeny and new classification of the chromodorid nudibranchs. *PLoS ONE* 7(4): e33479. [[ver texto](#)]

new combination reference Johnson R.F. & Gosliner T.M. (2012) Traditional taxonomic groupings mask evolutionary history: A molecular phylogeny and new classification of the chromodorid nudibranchs. *PLoS ONE* 7(4): e33479., available online at <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033479> [[details](#)]

Última atualização: 11 Ago. 2017