Symphodus rostratus (Bloch, 1791)

AphiaID: 273574

BODIÃO

Biota (Superdominio) > Animalia (Reino) > Chordata (Filo) > Vertebrata (Subfilo) > Gnathostomata (Infrafilo) > Osteichthyes (Parvfilo) > Actinopterygii (Gigaclasse) > Actinopteri (Superclasse) > Teleostei (Classe) > Eupercaria incertae sedis (Ordem) > Labridae (Familia) > Symphodus (Genero)



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados

Descrição

Tem o corpo alongado, uma cabeça alongada e lábios finos;

Apresenta cor variável: verde claro, cinza, castanho, vermelho-acastanhado;

Tem uma barbatana dorsal longa e não dividida;

Pode atingir 13 cm, mas geralmente tem cerca de 8-10 cm;

A taxa de crescimento é mais rápida nos machos;

A sua longevidade é de cerca de 3-4 anos.

Distribuição geográfica

Em todo o Mediterrâneo e na parte ocidental do Mar Negro.

Habitat e ecologia

Habitat – vive principalmente sobre os tapetes de plantas marinhas de *Posidónia* e em recifes rochosos cobertos de algas, a uma faixa de profundidade de 1 – 50 m.

Alimentação – alimenta-se de pequenos organismos bentónicos como moluscos, crustáceos e equinodermes.

Reprodução – espécie ovípara, a desova ocorre na primavera (março a junho). O macho constrói um ninho de algas, no qual uma ou mais fêmeas põem ovos.

Características identificativas

Tem o corpo alongado, uma cabeça alongada e lábios finos;

Cor variável: verde claro, cinza, castanho, vermelho-acastanhado;

Barbatana dorsal longa e não dividida.

Facilmente confundível com:



Symphodus mediterraneus
Bodião-do-mediterrâneo



Symphodus bailloni
Bodião



Symphodus melops
Bodião-vulgar



Symphodus roissali
Bodião manchado

Estatuto de Conservação



Sinónimos

Coricus brama Nordmann, 1840
Coricus lamarckii (Risso, 1810)
Coricus rostratus (Bloch, 1791)
Coricus rubescens (Risso, 1810)
Coricus virescens (Bloch, 1791)
Crenilabrus rostratus (Bloch, 1791)
Crenilabrus scina (Forsskål, 1775)
Labrus scina Forsskål, 1775
Lutjanus lamarckii Risso, 1810
Lutjanus rostratus Bloch, 1791
Lutjanus rubescens Risso, 1810
Lutjanus virescens Bloch, 1791
Symphodus fulvescens Rafinesque, 1810
Symphodus scina (Forsskål, 1775)
Symphodus scina (Forsskål, 1775)

Informação Adicional

Pesquise mais sobre ***Symphodus rostratus*** > ~Marine Species Identification Portal ~ fishbase ~CIB

Referências

Pollard, D. 2014. Symphodus rostratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T187573A49025124. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-3.RLTS.T187573A49025124.en.

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2017). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at http://www.fishbase.org [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. , available online at http://www.fishbase.org [details]

additional source Froese, R. & D. Pauly (Editors). (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. version (10/2018)., available online at http://www.fishbase.org [details]

ecology source Looby, A.; Erbe, C.; Bravo, S.; Cox, K.; Davies, H.L.; Di Iorio, L.; Jézéque, Y.; Juanes, F.; Martin, C.W.; Mooney, T.A.; Radford, C.; Reynolds, L.K.; Rice, A.N.; Riera, A.; Rountree, R.; Sprie, B.; Stanley, J.; Vela, S.; Parsons, M.J.G. Underwater Soniferous Behavior Trait Provided in the World Register of Marine Species. (In preparation). [details]

Última atualização: 14 Fev. 2019