

# *Felimare cantabrica* (Bouchet & Ortea, 1981)

AphialD: 597543

## NUDIBRÂNQUIO

Biota (Superdomínio) > Euthyneura (Infraclasse) > Ringipleura (Subterclasse) > Nudipleura (Superordem) > Doridina (Subordem) > Doridoidei (Infraordem) > Chromodoridoidea (Superfamília) > Miamirinae (Subfamília) > Felimare (Género)



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados



Vasco Ferreira Todos os direitos reservados

## Identity confusions:

---



*Felimare fontandraui*  
Nudibrânquio



*Felimare bilineata*  
Nudibrânquio



*Felimare tricolor*  
Nudibrânquio



*Felimare villafranca*  
Nudibrânquio

## Conservation status and major threats

---



## Synonyms

---

*Hypselodoris cantabrica* Bouchet & Ortea, 1980

## References

---

Johnson R.F. & Gosliner T.M. (2012) Traditional taxonomic groupings mask evolutionary history: A molecular phylogeny and new classification of the chromodorid nudibranchs. *PLoS ONE* 7(4): e33479. [\[ver texto\]](#)

new combination reference Johnson R.F. & Gosliner T.M. (2012) Traditional taxonomic groupings mask evolutionary history: A molecular phylogeny and new classification of the chromodorid nudibranchs. *PLoS ONE* 7(4): e33479., available online at <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033479> [\[details\]](#)

Last update: 11 Dec. 2017